

ALLEGATO A

SCHEDA DI SEGNALAZIONE SOSPETTA INFESTAZIONE DA PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME (Utilizzare una scheda per ogni singola Palma)

Data (*) _____

Identità segnalatore (*) _____

IDENTIFICAZIONE PALMA

o Tipo botanico Tipo Phoenix, Jubea, ecc. (foglie pennate)

o Tipo Washingtonia, Chamaerops, ecc. (foglie palmate).

Dimensioni Altezza tronco (stipite) cm. _____

Diametro medio tronco cm. _____

Sintomi osservati: Chioma collassata o essiccata o cimata di recente

Pianta isolata

Pianta in gruppo

le altre palme manifestano sintomi ? **SI NO** (se si, compilare altre schede)

UBICAZIONE PALMA

Località (*) _____

Indirizzo (*) _____

(Specificare Via, Strada, Piazza, ecc., Numero civico e CAP)

DATI DEL POSSESORE DELLA PALMA

Cognome (*) _____

Nome (*) _____

Domicilio legale (*) _____

(Specificare Via, Strada, Piazza, ecc., Numero civico e CAP)

Telefono (*) _____

Fax e-mail _____

Eventuali annotazioni: _____

Firma del segnalatore (*) _____

(*) I campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori per l'accoglimento della segnalazione.

La scheda deve essere inviata a mezzo Fax al numero 0961/852221 alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione – Servizio Fitosanitario ed al numero 0961/881332 al Comune di Catanzaro Settore Igiene Ambientale (Corso Mazzini n. 188 - e-mail: igieneambientale@comunecz.it)

“INDICAZIONI ATTE AL RICONOSCIMENTO DELL'INFESTAZIONE ”

RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS comunemente dette PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA.

Si tratta di un insetto, un coleottero curculioide, dannoso soprattutto allo stadio di larva, che divora voracemente le parti tenere della corona delle palme.

I sintomi riscontrabili sono inizialmente a carico delle foglie apicali: vista in lontananza la pianta mostra asimmetria della cima.

Successivamente l'intera cima si piega, afflosciandosi su se stessa e la palma sembra a distanza come capitozzata.

Da vicino la cima appare fortemente danneggiata e in avanzato stato di marcescenza.

In seguito all'avanzare dell'attività di nutrizione delle larve, l'intera chioma apparirà con tutte le foglie ripiegate verso il basso.

Le palme in questo stadio di infezione sono già irrimediabilmente compromesse.

A terra si possono rinvenire foglie con la base interessata da gallerie e erosioni, provocate dalle larve del punteruolo nonché di bozzoli della lunghezza di 3/5 cm e dall'aspetto di piccole noci di cocco ed infine adulti.

Nelle piante in buono stato vegetativo e non infestate, sono assolutamente da evitare gli interventi cesori poiché le ferite sono i siti per l'ovideposizione del parassita.